

## UYUZ TEDAVİ BİLGİLENDİRME FORMU (PERMETRİN LOSYON İÇİN)

**Dikkat! Ev halkının tamamı (kaşınma ve uyuz belirtileri olsun ya da olmasın) ve yakın teması olan herkes tedaviyi uygulamalıdır.**

TEDAVİ EDİLMEMİŞ KİŞİLER, HASTALIK BELİRTİSİ OLMASA BİLE UYUZ AKARINI VÜCUDUNDA TAŞIYABİLİR VE SİZLERİN TEKRAR ENFEKTE (UYUZ) OLMANIZA SEBEP OLABİLİRLER.

1. Losyonu uygulamadan önce el ve ayak tırnaklarınızı kesiniz.
2. Akşam banyo/duş alıp kurulanınız ve 1 saat bekleyiniz.
3. Losyonu; kulak arkasından başlayarak boyundan aşağı **tüm vücuda**, tırnak altları, parmak araları, göbek deliği ve genital bölge dahil sürülmedik alan kalmayacak şekilde uygulayınız. Erkekler; kılların yoğun olduğu bölgeleri gereğinde tıraş ederek uygulamalı ve ilacın yeterli uygulandığından emin olmalıdır.
4. Doktorunuz belirtmediyse ilacı yüzünüze ve saçınıza sürmeyiniz.
5. İki yaşından küçük çocuklar, yüzünde ya da saçlı derisinde kaşını/lezyon bulunan hastaların saçlı deri ve yüzüne de ilaç uygulanmalıdır. Yüze ilaç uygulanırken göz ve ağız mukozasına temas ettirilmemelidir.
6. Uygulanacak losyon miktarı;
  - **Erişkinler ve 12 yaştan büyükler** : 30 ml (6 kapak)
  - **6-12 yaş** : 15 ml (3 kapak)
  - **1-5 yaş** : 7,5 ml (1,5 kapak)
  - **2 aylık-1 yaş** : 3,75 ml (1 kapağın 3/4'ü)
7. Losyon vücudunuzda en az 8-10 saat kalmalıdır. Eğer gece uyanıp elinizi yıkarsanız veya başka bir sebeple losyon sürdüğünüz bölgeyi yıkarsanız, o bölgelere tekrar losyon sürmeyi unutmayınız.
8. Yeterli zaman (**8-10 saat**) sonra duş alınız ve temiz, yeni yıkanmış elbiseler giyip, temiz yatak örtüleri kullanınız.
9. Tedaviye başladığımız gün daha önce giyilen ya da giyilmeyen, gardıropta bekletilenler dahil tüm çamaşırları, elbiseleri, nevresimleri, yatak örtülerini, çarşafaları, havluları çamaşır makinesinde **60 °C (derece)'den yüksek** sıcaklıkta yıkayınız. Yüksek derecede yıkanamayacak mont, renkli elbiseler, ayakkabılar vb. eşyaları plastik bir torbaya koyup havasız kalacak şekilde ağzını düğümleyerek **3-7 gün** balkonda muhafaza ediniz.
10. Aynı tedaviyi **7 gün sonra yukarıda anlatıldığı gibi yeniden tekrarlayınız.**
11. Evdeki mobilyalar ve zemin elektrikli süpürge ile vakumlanmalıdır.
12. Diğer insanlarla yakın temastan bir süre uzak durulmalıdır.
13. İlk tedaviden sonra; yetişkinler işe, çocuklar okula geri dönebilir.
14. Tedaviyle ilk günler uyuz mikrobunun ölmesine bağlı kaşıntınız şiddetlenebilir, fakat 2. haftada kaşıntınızın %50 oranında düzelmesi, 4. haftada ise tamamen geçmesi beklenmektedir. Bu süre sonunda kaşıntınız devam ediyorsa kontrol muayenesine gitmeniz gereklidir.